


Eczéma folliculaire



Lichen plan généralisé



Brûlure de la plante du pied chez un enfant ayant marché sur feu

Pansement AQUACEL quotidien



Brûlure à J1



Brûlure à J2

Abcès à la racine cuisse nourrisson 10 mois



Traité par PYOSTACINE 50mg/kg pendant 7 jours

Prurigo lichénifié



Chéloïde post varicelle



Retien pour traitement
II de Chéloïde cervicale.

SAT

Ord Med 2300

KENACORT 80 1000
dang 500

Kit PST 300

Acte 500

26/06/2014



Ordonnance pour un traitement
par injection de Kénacort

Chéloïdes suite à un accident de la voie publique



8/2/07
D 3703
Pds 55kg
TA 100/50
MDC = cicatrices chéloïdes
suite accident août 2016
ATI = infection kenacort avec
des mojet
Remuez vous le 10/02/07 51000
Donnée
Kenacort 80 mg 3000
xylocaine 1% 2 boîtes
non adhésive 500
Kit pansement 1 boîte
Acte infection 300
de mojet 1000

DISPENSARE MATERINTE
ST PHARMACIE
M. VERBENA
M. DE TERNINADER
Centre de Santé
Assistant
Médical
LUC THOMAS

Ordonnance pour un traitement par
injection de Kénacort

Ulcération cicatricielle post érysipèle



Traité par pansement AQUACEL

Cicatrice de la cuisse suite à une prise de greffe



Cicatrice pigmentée
post AVP



Cellulite infectieuse sur intertrigo



Traitée par PYOSTACINE
2 g/j pendant 7 jours

Folliculite chéloïdienne



Langue géographique

La langue présente plus ou moins un aspect de carte de géographie, avec des aires dépapillées roses entourées d'une bordure blanchâtre légèrement surélevée.



Parfois d'origine génétique, habituellement bénigne mais pouvant se compliquer de fissurations souvent marqueur d'un terrain psoriasique.

Papillome verruqueux à cautériser



Avant cautérisation



Après cautérisation

Suspicion de kyste thyroïdologique

Suspicion de kyste thyroïdologique car situé sur la ligne médiane. Les kystes thyroïdologiques correspondent au reliquat du tractus thyroïdologique.



L'échographie cervicale confirmera la nature kystique de la masse et permettra de préciser la présence de la glande thyroïde.

Le traitement est chirurgical.

Abcès palmaire avec cellulite infectieuse de la main



Traitement par évacuation de l'abcès
puis pansement avec antibiothérapie
par Pyostacine 500mg 2cps 2 fois par
jour pendant 7 jours

Teigne trichophytique
traitée par GRISEFULINE
cps 500mg ; 20mg/kg
pendant 6 semaines



Dermatophytie circonée
traitée par crème imidazolée



Protection coutumière de la fontanelle avec de la boue séchée



Erythème polymorphe atteinte cutanéomuqueuse



Erythème polymorphe
pigmentation séquellaire



Verrues génitales et molluscum contagiosum du périnée traités par cautérisation

